

Türkiye'de Uyuşturucu Madde Kullanımına Bağlı Ölümler

Sanırım kimse bu kadarını tahmin etmiyordu. Artık yaklaşan bir tehlike ifadesi yerine kucağımızdaki tehlike ifadesi daha uygun olur. Türkiye'de uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölümlerden bahsediyorum. Sanırım acil hekimlerimiz hayata tutunamamış bu hasta grubuyla çok daha fazla temasta olacak. İşte ülkemizde son durum;

Genel durum

Türkiye genel uyuşturucu madde kullanım oranı 2013 yılına göre 2014 yılında %17 artmış.

Bonzai kullanımı 2013 yılına göre 2014 yılında %38 artış göstermiş.

2014'de 648 kişi (19'u kadın) uyuşturucu kullanımına bağlı eks olmuş.(2013 de bu sayı 162!!!)

Ülkemizde uyuşturucu maddeye bağlı ölümlerden neler sorumlu?

Uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölümlerde saptanan maddelerin yıllara göre dağılımı şöyle.


Afyon türevleri (eroin, morfin vb.) en sık!

	2009	2010	2011	2012	2013
Afyon Türevi	147	112	85	124	164
Kokain	5	15	10	19	29
Metamfetamin	0	6	2	1	11
Amfetamin	0	0	4	3	13
Ekstazi	0	1	19	29	58
Volatil Maddeler	6	7	5	12	10
Esrar	20	21	20	37	62

Kaynak: Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 2014.

Ölümler hangi yaş grubundan?

2009-2013 yıllarındaki uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölümlerin yaş dağılımı (20-29 yaş en riskli)



Ölümler en sık hangi illerde?

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
İstanbul	86	93	77	57	45	70	115
Antalya	8	6	18	15	5	25	25
Adana	4	8	8	14	9	15	17
Ankara	3	2	1	4	5	7	13
İzmir	1	0	0	1	2	3	11
Mersin	0	1	3	3	6	9	7
Gaziantep	10	10	9	9	4	9	7
Kocaeli	1	0	5	1	1	4	5
Hatay	1	1	3	2	2	1	4
Bursa	0	2	0	3	2	1	3

Kaynak: Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 2014.

Ölümlere neden olan maddelerin il ili dağılımı

Eroin, morfin gibi afyon türevlerine bağlı olanlar



Ekstazi kullanımına bağlı olanlar



Kokain kullanımına bađlı olanlar



Kaynak:

<http://www.kom.pol.tr/tubim/Sayfalar/T%C3%BCrkiye-Uyu%C5%9Fturucu-Raporu.aspx>

Prof. Dr. Mustafa SERİNKEN
aserinken@hotmail.com